

注射室須知

衛生福利部屏東醫院

地址：屏東市自由路 270 號

電話：(08) 7363011 轉 2183

http://www.pntn.mohw.gov.tw

□肌肉注射

- 1、注射後請以酒精棉緊壓住注射部位 3~5 分鐘直到注射部位無出血情形為止，並依護理人員指示，給予揉搓 1 分鐘或不需揉搓，
- 2、返家後如發現注射部位劇烈疼痛、發腫可用熱毛巾熱敷 3~5 分鐘，可緩解症狀。
- 3、注射結束後隨時注意有無過敏反應，若有不適情形出現，請立即返院就醫。

□靜脈注射(小量注射)

- 1、注射時及注射完畢後如果有紅腫熱痛及任何不適，請立即通知護理人員。
- 2、移除針頭時，請以酒精棉緊壓住注射部位 3~5 分鐘，勿揉搓直到注射部位無出血情形為止。

- 3、注射結束後隨時注意有無過敏反應，若有不適情形出現，請立即返院就醫。

□靜脈注射(大量點滴)

- 1、請勿自行調整點滴速度，以免影響藥物作用及增加心臟負荷。
- 2、注射部位如果有紅腫熱痛及任何不適，或點滴管內有回血或不滴時，請立即通知護理人員。
- 3、下床活動時，請使用活動式點滴架，並將點滴瓶放在高過注射部位約一個手臂的距離，如遇到回血情形，請告知護理人員
- 4、點滴滴注時，請勿折到或拉扯點滴管路。
- 5、靠注射部位最近的關節，盡量勿彎曲。請用未被注射的手做事（如：拿話筒、量血壓）。

衛生福利部屏東醫院—「屏醫衛編碼 NO. 261：注射室須知」衛教指導

衛教人員已說明上述指導內容，並已瞭解。

衛教指導人員： 說明日期： 年 月 日 病人或家屬： 關係：

- 6、移除針頭時，請以酒精棉緊壓住。
- 7、注射部位 3~5 分鐘，勿揉搓直到注射部位無出血情形為止。
- 8、注射結束後隨時注意有無過敏反應，若有不適情形出現，請立即返院就醫。

皮下注射

1. 注射完畢勿搓揉。
2. 注射結束後隨時注意有無過敏反應，若有不適情形出現，請立即返院就醫。

疫苗接種(A 型肝炎疫苗、B 型肝炎疫苗、狂犬病疫苗、德國麻疹疫苗、子宮頸疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗)

- 1、接種後請以酒精棉緊壓住注射部位 3~5 分鐘，不需揉搓直到注射部位無出血情形為止。
- 2、接種後請於注射室觀察至少 30 分鐘，如無立即不良反應產生方可返

家休息。

- 3、注射結束後如發現注射部位劇烈疼痛、發腫可用熱毛巾熱敷 3~5 分鐘，可緩解症狀。
- 4、返家後隨時注意有無過敏反應，若有不適情形出現，請立即返院就醫。

制定日期：104 年 05 月

審閱日期：104 年 06 月